

**Ficha de Exercício | Trabalho | Avaliação**

<b>Curso</b>	Primeiros Socorros			<b>Duração</b>	04:00
<b>Tipo de ficha</b>	Ficha <input type="checkbox"/>	Trabalho <input type="checkbox"/>	Teste <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Tipo de Avaliação</b>	Diagnóstica <input type="checkbox"/> Contínua <input type="checkbox"/> Sumativa <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Escala de avaliação</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 0-20		<input type="checkbox"/> Outra: _____		
<b>Nome do formando (completo)</b>				<b>Data</b>	08/02/2025
<b>Formadora</b>	Joana Silva			<b>Classificação</b>	<input type="text"/>

Chegou o momento de validar as aprendizagens adquiridas.  
 Este teste de avaliação permitirá consolidar e refletir sobre os conhecimentos essenciais em Primeiros Socorros.  
 Responda com atenção!

Responda a todas as alíneas colocando um X na alínea que considerar verdadeira (V) ou falsa (F).  
 No caso de se enganar, desenhe um círculo em torno da resposta errada e assinale aquela que considera correta.

Cada afirmação equivale a 1 pontos da cotação total (1/20).

**Questão 1 – Considere a cadeia de sobrevivência no adulto**

Cotação:

	V	F
1. A ativação do sistema de emergência médica é o primeiro e mais importante elo da cadeia de sobrevivência.		
2. O início imediato de SBV por quem presencia uma PCR, melhora a probabilidade de sobrevivência da vítima.		
3. Todos os elos da cadeia são igualmente importantes.		

**Questão 2 – Considere a posição lateral de segurança**

Cotação:

	V	F
1. Mantém a permeabilidade da via aérea.		
2. Reduz o risco de aspiração de conteúdo gástrico.		
3. Deve ser efetuada suavemente deixando a vítima numa posição estável.		

**Questão 3 – Considere o algoritmo de SBV Adulto**

Cotação:

	V	F
1. Ao verificar que uma vítima não respira deve ligar 112 de imediato.		
2. A exaustão é uma das situações em que podemos parar as manobras de SBV.		
3. Para efetuar manobras de SBV a vítima deve estar em decúbito dorsal.		
4. Se alguma insuflação não for eficaz devemos repetir até conseguir que seja eficaz.		

**Questão 4 – Considere a obstrução da via aérea**

Cotação:

	V	F
1. Se uma vítima adulta com obstrução da via aérea está a tossir deve iniciar pancadas nas costas.		
2. Se uma vítima adulta com obstrução da via aérea não consegue tossir deve ligar 112.		
3. Nas grávidas e em crianças com menos de um ano (latentes) não devemos efetuar compressões abdominais.		

**Questão 5 – Considere as seguintes afirmações**

Cotação:

	V	F
1. Não deve ser dado nada de comer ou beber à vítima de possível AVC.		
2. Durante uma convulsão devem ser contidos os movimentos da vítima.		
3. A sensação de fome é característica da hipoglicemia.		
4. A lipotimia caracteriza-se por um episódio de fraqueza muscular.		
5. Em caso de envenenamento, deve ligar-se para o CIAV.		
6. Os objetos empalados não devem ser removidos.		
7. Em caso de entorse, não deve ser aplicado gelo.		